

19.12.06

LA CONCENTRACIÓ DE NICOTINA DISMINUEIX QUASI UN 84% EN ELS BARS I RESTAURANTS DECLARATS LLIURES DE FUM

La variació dels nivells de nicotina en discoteques i pubs després de l'aplicació de la llei de tabaquisme no és significativa

L'entrada en vigor de la llei de tabaquisme ha suposat una disminució dels nivells de nicotina en l'aire ambient en diferents dependències públiques i privades però no l'ha eliminat del tot, ni tant sols en les dependències on no és possible fumar. Així, es pot constatar que les **disminucions més elevades han estat en bars i restaurants on s'ha prohibit fumar amb un 83.54%** de disminució, i en **empreses privades** amb una disminució dels nivells de nicotina **del 82%**. En dependències de **l'Administració Pública** la disminució ha estat **d'un 60%** i a les **Universitats** d'un **68.4%**. La variació dels nivells de nicotina en **bars i restaurants de més de 100 m2** també ha estat significativa amb un **63%**. On s'ha observat una menor disminució ha estat en **bars i restaurants de menys de 100 m2** amb una **disminució del 30%**. La variació dels nivells de nicotina en discoteques i pubs no ha estat significativa.

Aquestes dades s'obtenen d'un estudi que ha analitzat la presència de nicotina en l'aire ambient en 114 dependències de l'Administració, 47 centres universitaris, 200 empreses privades i 133 locals d'hosteleria de les 8 comunitats autònomes (Balears, Cantàbria, Catalunya, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galícia, La Rioja i Madrid). La presa de les mostres es va fer **en el darrer trimestre de 2005**, abans de l'aplicació de la nova Llei Antitabac, **i es va repetir en els mateixos locals i centres entre març i abril de 2006** (als 2 mesos de l'aplicació de la nova llei).

L'ASPB fa unes 50 inspeccions mensuals sobre el compliment de la llei antitabac

Des de l'aplicació de la llei s'han rebut 344 denúncies referides a la ciutat

L'ASPB des del mes de gener ha fet actuacions informatives, especialment a sectors on es preveien majors dificultats en fer complir la llei com, per exemple, universitats, estacions de metro i ferrocarril, alguns gremis, etc. Com que l'Agència té conferida l'autoritat sanitària en els locals alimentaris de la ciutat, ara realitza una inspecció de seguiment dels establiments alimentaris denunciats, per comprovar si han resolt la situació. Això inclou bars i restaurants, comerç i indústries alimentàries, establiments amb obrador (forns, pastisseries, rustisseries...), que són els espais on els serveis d'inspecció sanitària dels aliments de l'Agència actuen habitualment. En els altres establiments transmet la informació a l'administració competent per que actui. Del gener al novembre de **2006** els serveis d'inspecció sanitària dels aliments han fet unes **900 visites i accions d'inspecció** i de coneixement de la situació, complementant la seva tasca habitual de control alimentari.

En els darrers temps l'Agència **ha rebut cada mes una mitjana de 50 denúncies, realitzat una mitjana de 50 inspeccions i tramitat una mitjana de 5 expedients sancionadors mensuals per incumpliment de la llei de tabac (el que equival a un 10% de les denúncies rebudes en aquest període a la ciutat)**. Globalment la mitat han estat a forns o pastisseries amb degustació, i l'altra mitat a bars i restaurants: a la ciutat els altres establiments expedientats són molt pocs. La majoria dels incumpliments reiterats s'han resolt amb els expedients sancionadors incoats, malgrat que alguns establiments han presentat alegacions i el procediment no s'ha tancat encara.



La reducció a de l'exposició al fum ambiental de tabac protegeix contra el càncer, i en estudis recents s'ha vist que comporta una disminució del risc de episodis de malaltia coronària en persones sensibles. De fet, les últimes dades indiquen que **a Espanya moren anualment 6.200 fumadors pasius**. Es esperable una disminució de la malaltia i la mortalitat coronàries durant l'any 2006. La millora assolida fa pensar també que avui la major font d'exposició al fum ambiental de tabac –fora de bars, restaurants i locals nocturns que permeten fumar- es situa al domicili de les persones fumadores. Els nens son especialment sensibles a aquesta exposició, que es una de les causes principals d'asma infantil, un dels problemes de salut crònics més freqüents a l'edat escolar. Els serveis de salut pública recomanen a les famílies d'evitar l'exposició dels nens al fum ambiental de tabac, i estan fent un projecte pilot de prevenció per facilitar-ho.