



Com prevenir el limfogranuloma veneri (LGV) Document informatiu sobre infeccions de transmissió sexual

Què és el limfogranuloma?

El limfogranuloma veneri (LGV) és una infecció de transmissió sexual present a països tropicals, que ha reaparegut a Europa i, des de fa un temps a Espanya. Es contagia amb pràctiques de sexe anal, vaginal i oral sense protecció. També per l'ús compartit de joguines sexuals (consoladors) sense desinfectar.

Com es manifesta?

Els símptomes del limfogranuloma veneri poden aparèixer des del tercer dia després del contacte i fins 30 dies després, amb una petita lesió que no fa mal al penis, recte, vagina, boca o gola. La lesió desapareix als pocs dies, però en dues o tres setmanes la infecció s'estén als ganglis veïns, amb aparició de dolor. Si el contagi s'ha produït al penis, pot haver-hi dolor en orinar, i aparèixer sang o pus a la uretra. Si està afectat l'anus, hi pot haver diarrea, dolor abdominal, i dificultat per fer les deposicions, amb emissió de pus o sang.

Com es pot prevenir?

Per reduir el risc d'infecció sexual:

- Reduir el nombre de parelles sexuals
- Utilitzar sempre condons, també amb les joguines sexuals
- Fer servir guants de làtex si es fan pràctiques com el fisting

Què fer si hi ha símptomes d'infecció?

- Evitar el contacte sexual fins fer el tractament
- Consultar al metge/essa o a una Unitat d'Infeccions de Transmissió Sexual
- Informar a tots els nostres contactes sexuals d'immediat perquè es puguin sotmetre a revisió

Més informació

Agència de Salut Pública de Barcelona, Servei d'Epidemiologia (Tel. 93 238 45 55. Fax 93 218 22 75). A Internet:

http://www.aspb.cat/quefem/docs/Limfogranuloma%20veneri_ext_08.pdf

Unitat d'Infeccions de Transmissió Sexual: Avda. Drassanes, 17-21. Tel. 93 441 46 12.