

Informació per a professionals de salut

Lipoatròfia semicircular més enllà de l'àmbit laboral

L'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) estableix una sèrie de recomanacions per a casos de possible lipoatròfia semicircular (LS).

Cal recordar que ja es disposa d'un Protocol que estableix amb detall els procediments a seguir si es detecta aquest trastorn en l'àmbit laboral (<https://bit.ly/2QouVJj>).

De manera general, i davant la sospita d'un cas de LS, hem de tenir en compte:

- El diagnòstic és clínic, procurar no confondre amb cel·lulitis. Cal evitar fer ecografies, ja que no és una eina diagnòstica en LS.
- Les possibles causes de LS son diverses, en tot cas, si no es té clar quin és l'origen, especificar "d'etiologia desconeguda".
- Si es tracta d'àmbit laboral, detallar quina és la relació del treballador amb els elements de l'entorn de treball, en especial amb el mobiliari.
- Declaració: si és un cas de possible origen laboral cal comunicar-ho al Servei de Prevenció, si és un brot, en el cas de Barcelona, al Servei d'Epidemiologia de l'ASPB.



Juny 2013

Agència de Salut Pública de BarcelonaPlaça Lesseps, 1 · 08023 Barcelona · Tel. 93 238 45 45 · www.aspb.cat