

Vacunació gripal

Preguntes i respostes

20
19



Cita recomanada

Alba Asensio, Xavier Argerich, Sandra Gabarró, Sònia Gil, Laura Ricart, Manuel Fernández, Èlia Díez. Preguntes i respostes vacunació antigripal.
Barcelona: Agència de Salut Pública de Barcelona, 2019

©2019 Agència de Salut Pública de Barcelona

Tots els drets reservats. No es permet la reproducció total ni parcial
de las imatges o textos d'aquesta publicació sense prèvia autorització.

<https://www.aspb.cat/>

Preguntes i respostes vacunació antigripal

de l'[Agència de Salut Pública de Barcelona](#) està subjecta a una llicència de
[Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional de Creative Commons](#)

Els permisos addicionals als d'aquesta llicència es poden trobar a:

<https://www.aspb.cat/documents/vacunacio-antigripal/>



Índex

Presentació	3
Al·lèrgies i intoleràncies	4
Embaràs i Lactància	9
Anticoagulants	11
Infants	12
Immunodepressió	14
Viatgers	15
Més informació	16

Presentació

Aquest document té l'objectiu de facilitar el treball als professionals sanitaris vinculats a la vacunació antigripal. Recull les respostes a les preguntes més freqüents que els equips sanitaris han fet al Servei de Gestió Integral de Vacunes (SeGIV) de Barcelona durant la campanya 2018-19 de vacunació antigripal.



Al·lèrgies i intoleràncies

Si una persona té al·lèrgia a l'ou es pot vacunar?

Actualment les dues vacunes que s'utilitzen (Chiromas® i Chiroflu®) contenen proteïnes d'ou embrionat.

- Cal una valoració mèdica del risc i beneficis d'administrar la vacuna.
- L'experiència d'ús de vacuna antigripal en persones amb al·lèrgia a l'ou indica que la probabilitat d'una reacció greu és molt improbable, tot i que s'han comunicat ocasionalment casos d'anafilaxi.
- Per aquest motiu, la vacunació en aquest casos s'ha de fer sempre en un entorn que garanteixi la seguretat davant una reacció anafilàctica, amb professionals amb capacitat per a fer el tractament i la reanimació cardiopulmonar.

Per a les persones amb historial d'al·lèrgia a l'ou, basant-se en la simptomatologia prèvia patida després d'exposar-s'hi:

1. Sí que es poden vacunar en els següents casos:

- Les persones amb historial d'al·lèrgia a l'ou que només han patit urticària després d'exposar-se a l'ou sí que poden vacunar-se amb la vacuna contra la grip inactivada.
- Les persones que han patit simptomatologia diferent d'urticària – a excepció del xoc anafilàctic – també es poden vacunar de l'antigripal inactivada.

2. No es poden vacunar en els següents casos:

- Les persones que han patit una reacció al·lèrgica greu –per exemple, xoc anafilàctic– anterior a la vacuna antigripal, independentment del component sospitós de ser responsable de la reacció. Per aquestes persones s'aconsella la vacuna en cultiu cel·lular.

Les persones intolerants a l'ou es poden vacunar?

Sí que es poden vacunar ja que la intolerància a l'ou en si no és una contraindicació per a vacunar-se de la grip.

Les persones al·lèrgiques a la penicil·lina es poden vacunar de Chiromas® i Chiroflu®?

Sí que es poden vacunar les persones al·lèrgiques a la penicil·lina amb Chiromas® i Chiroflu® perquè no en contenen. Encara que hi hagi alguna vacuna que en contingui, si la persona mai ha tingut una reacció anafilàctica greu, no n'estaria contraindicada la vacunació

Les persones al·lèrgiques als aminoglicòsids es poden vacunar de Chiroflu® i Chiromas®?

Les vacunes Chiroflu® i Chiromas® **sí que contenen** kanamicina i neomicina.

Les vacunes Chiroflu® i Chiromas® **no contenen** estreptomicina ni gentamicina.

Es contraindica la vacunació en les persones que **hagin presentat una reacció anafilàctica greu en l'administració prèvia d'aquests antibiòtics**. La hipersensibilitat cutània a pomades que continguin aquests antibiòtics no en contraindica la seva vacunació.

Les persones al·lèrgiques al tiomersal es poden vacunar de Chiroflu® i Chiomas®?

Sí que es poden vacunar de Chiroflu® i Chiomas® ja que no contenen tiomersal. Aquest component és un conservant que només es fa servir en vials de multidosi.


Per conèixer què contenen les vacunes Chiomas® Chiroflu® s'ha de consultar la seva fitxa tècnica.
https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/63566/FichaTecnica_63566.html

Embaràs i Lactància

Es poden vacunar les dones que estan alletant?

Sí que es poden vacunar, ja que no hi ha cap problema en alletar i rebre o haver rebut la vacuna antigripal.

L'única vacuna contraindicada de manera general a les dones que alleten és la de la febre groga, ja que s'ha comprovat que el virus que conté es transmet a través de la llet.



Es pot administrar a una dona embarassada conjuntament la gammaglobulina anti-D, la antigripal i la dTpa?

Sí que es poden administrar de forma simultània en diferents llocs anatòmics, vacunes inactivades i immunoglobulines.

A partir de quin període d'embaràs es pot vacunar de l'antigripal?

Durant qualsevol moment de l'embaràs es recomana administrar la vacuna antigripal.

Anticoagulants

Una persona que pren anticoagulants pot vacunar-se de la grip?

Sí que es poden vacunar els pacients que estan sota tractament amb anticoagulants però es recomana per **via subcutània** per evitar el risc d'hematomes musculars.

La via intramuscular és segura, en els pacients amb **tractament anticoagulant oral ben controlats**, si es realitza pressió en el punt de la inoculació.

Infants

Es pot vacunar a un nounat de la vacuna antigripal?

No s'ha d'administrar la vacuna als infants **menors de 6 mesos** d'edat.

Fins a quina edat s'ha de vacunar als infants amb dues dosis?

S'han de vacunar amb dues dosis i amb un interval de 4 setmanes els **menors de 9 anys** que es vacunen **per primera vegada**. En les temporades successives s'administrarà una sola dosi.

S'ha de vacunar als infants amb 0,25ml?

Per tal d'evitar riscos d'administrar una dosi inferior durant la manipulació de la vacuna **la dosi de 0,5ml és correcta** i no és necessari vacunar als infants amb 0,25ml.

Quina és la via d'administració pels menors de 12 anys?

Es recomana exclusivament **la via intramuscular** en els joves menors de 12 anys, ja que la vacuna administrada per via subcutània és més reactiva que per via intramuscular.




Immunodepressió

Una persona immunodeprimida es pot vacunar?

Sí, es recomana la vacunació antigripal anual a totes les persones immunodeprimides tal i com ho indica a la [guia tècnica per la campanya de vacunació antigripal estacional](http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/vacunacions/06vacunacio-antigripal/informacio-de-temporada/ASPCAT-GUIA-CAMPANYA-GRIP.pdf) (http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/vacunacions/06vacunacio-antigripal/informacio-de-temporada/ASPCAT-GUIA-CAMPANYA-GRIP.pdf)

La vacunació també es recomana als contactes domiciliaris i cobra especial importància si la persona immunodeprimida és menor de 6 mesos pel fet que no pot ser vacunada.



Viatgers

Una persona que ha estat vacunada aquest any a l'hemisferi sud, s'ha de tornar a vacunar aquí?

Sí que cal vacunar, ja que la composició de la vacuna antigripal de l'hemisferi sud pot diferir de la de l'hemisferi nord.



Recorda que si és necessari es pot seguir administrant vacunes antigripals fins a la seva caducitat que normalment és entre el mes de juny i juliol.

Més informació

- Guia Tècnica per a la campanya de vacunació antigripal estacional 2019-20:
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/vacunacions/06vacunacio-antigripal/informacio-de-temporada/ASPCAT-GUIA-CAMPANYA-GRIP.pdf
- Manual de Vacunacions de Catalunya:
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/vacunacions/00manual_de_vacunacions/Manual-de-vacunacions.pdf
- Catàleg de vacunes de l'Agència de Salut Pública de Barcelona:
<http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/g/grip/>
- Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), vacunació antigripal:
http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/vacunacions/Vacunacio-antigripal/
- Generalitat de Catalunya, Canal Salut:
<http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/g/grip/>

